

AMFLEE 2,5 MG/ML SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO CUTÂNEA PARA CÃES E GATOS (fipronil 2,5 mg). **NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** 839/01/14DFVPT de 29-09-2014. **AMFLEE 50 MG SOLUÇÃO PARA UNÇÃO PUNCTIFORME PARA GATOS** (Fipronil 50 mg). **NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO** 894/01/15DFVPT de 17-02-2015. **AMFLEE 67 MG SOLUÇÃO PARA UNÇÃO PUNCTIFORME PARA CÃES PEQUENOS;** Fipronil 67 mg **NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** 894/02/15DFVPT de 17-02-2015. **AMFLEE 134 MG SOLUÇÃO PARA UNÇÃO PUNCTIFORME PARA CÃES MÉDIOS;** Fipronil 134 mg **NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** 894/03/15DFVPT de 17-02-2015. **AMFLEE 268 MG SOLUÇÃO PARA UNÇÃO PUNCTIFORME PARA CÃES GRANDES;** Fipronil 268 mg **NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** 894/04/15DFVPT de 17-02-2015. **AMFLEE 402 MG SOLUÇÃO PARA UNÇÃO PUNCTIFORME PARA CÃES MUITO GRANDES;** Fipronil 402 mg de 17-02-2015. **NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** 894/05/15DFVPT de 17-02-2015. **Indicações:** Tratamento de infestações por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) e carraças (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) em cães e gatos. Tratamento de infestações por piolhos mordedores em cães (*Trichodectes canis*) e gatos (*Felicola subrostratus*). O medicamento veterinário pode ser aplicado como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo da Dermatite Alérgica à Picada da Pulga (DAPP). Dependendo do meio ambiente, a eficácia inseticida contra novas infestações por pulgas adultas persiste até 2 meses em gatos e até 3 meses em cães (Amflee spray), 4 semanas (Amflee 50 mg) e 8 semanas (Amflee 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg). Dependendo do nível de infestação do meio ambiente, o medicamento veterinário tem uma eficácia acaricida persistente até 4 semanas contra carraças (Amflee spray); até 4 semanas contra *Ixodes ricinus* e até 1 semana contra *Dermacentor reticulatus* e *Rhipicephalus sanguineus* (Amflee 50 mg); até 3 semanas contra *Ixodes ricinus* e até 4 semanas contra *Rhipicephalus sanguineus* e *Dermacentor reticulatus* (Amflee 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg). **Precauções especiais para utilização em animais:** É importante ter a certeza que o medicamento veterinário é aplicado numa área onde o animal não se possa lamber e assegurar que os animais não se lambam entre si após a aplicação. Pode ocorrer fixação pontual de carraças. Por este motivo, a transmissão de doenças infecciosas não pode ser totalmente excluída, se as condições não forem favoráveis. Manter os animais tratados longe de chamas ou outras fontes de calor, e superfícies que sejam facilmente afetadas por álcool por, pelo menos, 30 minutos após a administração do medicamento veterinário e até o pêlo estar totalmente seco. Não vaporizar para uma chama ou qualquer material incandescente. Evitar o contacto com os olhos do animal. Em caso de contacto ocular accidental, lavar imediata e abundantemente os olhos com água. Não aplicar o medicamento veterinário em feridas ou pele lesionada. Os animais devem ser pesados com a maior exatidão possível antes do tratamento. Exclusivamente para uso externo. **Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:** Este medicamento veterinário pode causar irritação das membranas mucosas e irritação ocular. O contacto do medicamento veterinário com a boca e olhos deve ser evitado. Em caso de contacto ocular accidental, lavar imediata e abundantemente os olhos com água. Se a irritação ocular persistir, procurar imediatamente um médico e mostrar-lhe o folheto informativo ou o rótulo. As pessoas com hipersensibilidade conhecida ao fipronil, dimetilsulfóxido, a álcool, aos excipientes devem evitar o contacto com o medicamento veterinário. Evitar que o conteúdo entre em contacto com os dedos. Se isto ocorrer, lavar as mãos com água e sabão. Os animais tratados não devem ser manuseados e não se deve permitir que as crianças brinquem com animais tratados até o local da aplicação estar seco. É recomendado que os animais não sejam tratados durante o dia, mas ao início da noite e que os animais tratados não durmam com os donos, especialmente com crianças. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação do medicamento veterinário. Conservar as pipetas na embalagem original e eliminar as pipetas utilizadas imediatamente. Durante a utilização do Amflee spray, vaporizar os animais ao ar livre ou num local bem ventilado. Não inalar o spray. Usar luvas de PCV ou de nitrilo durante a administração do medicamento veterinário aos animais. Recomenda-se o uso de um avental impermeável para proteger o vestuário. Se o vestuário ficar excessivamente molhado, deve ser retirado e lavado antes de voltar a usar. Descartar as luvas após a aplicação e lavar as mãos com sabão e água. Lavar os salpicos na pele com sabão e água imediatamente. Se ocorrer irritação, procurar um médico. Pessoas com asma podem ser particularmente sensíveis ao Amflee spray. Não administrar o medicamento veterinário se tiver tido alguma reação prévia ao mesmo. Tratamento de vários animais: uma boa ventilação é particularmente importante quando é necessário tratar vários animais. Tratar os animais ao ar livre, ou reduzir a formação de vapor removendo os animais do local onde são tratados enquanto o álcool evapora e assegurar que o local de tratamento é bem ventilado entre tratamentos individuais. Além disso, assegurar que o local onde os animais secam é bem ventilado e evitar colocar vários animais recentemente tratados no mesmo espaço. **Leia cuidadosamente as informações constantes no folheto informativo e em caso de dúvida contacte o Médico Veterinário ou o Farmacêutico.** Data de revisão do texto: 18 de fevereiro de 2020. SmPCPIL144534/5/6/7/8 e SmPCPIL155644_1