

**AMFLEE combo 50 mg/60 mg solução para unção punctiforme para gatos e furões**, n.º autorização 1002/01/16DFVPT; Data da autorização 11-04-2016. **AMFLEE combo 67 mg/ 60,3 mg solução para unção punctiforme para cães pequenos** n.º autorização 1002/02/16DFVPT; Data da autorização 11-04-2016. **AMFLEE combo 134 mg/ 120,6 mg solução para unção punctiforme para cães médios** n.º autorização 1002/03/16DFVPT; Data da autorização 11-04-2016. **AMFLEE combo 268 mg/ 241,2 mg solução para unção punctiforme para cães grandes** n.º autorização 1002/04/16DFVPT; Data da autorização 11-04-2016. **AMFLEE combo 402 mg/ 361,8 mg solução para unção punctiforme para cães muito grandes** n.º autorização 1002/05/16DFVPT; Data da autorização 11-04-2016. Composição qualitativa: Fipronil e S-Metopreno. **Indicações de utilização:** Gatos: Para ser usado contra infestações por pulgas, isoladamente ou em associação com carraças e/ou piolhos mordedores (exceto nos furões): - Eliminação de pulgas (*Ctenocephalides spp.*). A eficácia inseticida contra novas infestações de pulgas adultas persiste durante 4 semanas (gatos e furões), ou 8 semanas (cães). Prevenção da multiplicação das pulgas, por inibição do desenvolvimento dos ovos (atividade ovicida) e das larvas e pupas (atividade larvicida) descendentes de ovos postos pelas pulgas adultas, durante 6 semanas após aplicação (gatos) ou 8 semanas (cães). - Eliminação de carraças (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). O medicamento veterinário tem uma eficácia carracida persistente até 2 semanas (gatos), 4 semanas (furões) ou 4 semanas (cães) contra carraças. Eliminação de piolhos mordedores (*Felicola subrostratus*) nos gatos. Nos gatos e cães, o medicamento veterinário pode ser administrado como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo da Dermatite Alérgica por Picada de Pulga (DAPP), quando tiver sido previamente diagnosticada pelo médico veterinário. **Precauções especiais para utilização em animais:** Evite o contacto com os olhos do animal. É importante ter a certeza de que o medicamento veterinário é aplicado numa zona onde o animal não possa lambê-lo, e ter a certeza que os animais não se lambam entre eles após o tratamento. Pode verificar-se a fixação de carraças isoladas. Por esta razão a transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída, se as condições forem desfavoráveis. **Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento aos animais:** Este medicamento veterinário pode causar irritação nas mucosas, na pele e nos olhos. Por isso deve ser evitado o contacto com a boca, a pele e os olhos. Deve ser evitado o contacto de pessoas com hipersensibilidade conhecida a inseticidas ou álcool com o medicamento veterinário. Deve evitar-se o contacto com os dedos. No caso de contacto lavar as mãos com água e sabão. Depois de contacto accidental com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água potável. Lavar as mãos após a aplicação do medicamento veterinário. Em caso de ingestão accidental, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o folheto informativo ou rótulo da embalagem ao médico. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação. Enquanto o local de aplicação não estiver completamente seco os animais tratados não devem ser manuseados nem se deve permitir que as crianças brinquem com eles. Por conseguinte é recomendado que os animais não sejam tratados durante o dia mas sim ao entardecer, e que os animais recentemente tratados não durmam com os donos, especialmente com as crianças. **Outras precauções:** Os cães não devem ser autorizados a nadar em cursos de água nos dois dias seguintes ao tratamento. **Leia cuidadosamente as informações constantes no folheto informativo e em caso de dúvida contacte o Médico Veterinário ou o Farmacêutico. Data de revisão do texto:** dezembro de 2024. PI\_Text082087\_2; PI\_Text082088\_2; PI\_Text082089\_2; PI\_Text0820890\_2; PI\_Text082091\_2